

Está indicado en:

CARCINOMA DE ESÓFAGO

Localmente avanzado o metastásico

DE LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA

(con epicentro 1 a 5 centímetros por encima de la GEJ)

que no es susceptible de resección quirúrgica o quimiorradiación definitiva

- **1º Línea, combinado**

(con quimioterapia a base de platino y fluoropirimidina*)

No requiere biomarcador

*administrar Pembrox® antes de quimioterapia cuando se administren el mismo día

- **2º Línea o posterior en tumores escamosos, monoterapia**

(después de una o más líneas previas de terapia sistémica)

Requiere biomarcador **PD-L1 (CPS ≥ 10)**

Posología

200 mg \longrightarrow cada 3 semanas

400 mg \longrightarrow cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses

Está indicado en:

ADENOCARCINOMA GÁSTRICO O DE LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA (GEJ) HER2-POSITIVO

Localmente avanzado irresecable o
metastásico

- **1º Línea, combinado**
(con trastuzumab, quimioterapia a base de platino y fluoropirimidina*)

Requiere biomarcador **HER2+**

*administrar Pembrox® antes de Trastuzumab y quimioterapia cuando se administren el mismo día

Posología

200 mg —————> cada 3 semanas

400 mg —————> cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses

Está indicado en:

CARCINOMA HEPATOCELULAR

- **2° Línea, monoterapia**
(luego de sorafenib)
No requiere biomarcador

Posología

200 mg —————> cada 3 semanas

400 mg —————> cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses

Está indicado en:

CÁNCER COLORRECTAL

Irreseccable o metastásico

Ligado a inestabilidad microsatelital
(MSI-H)

o deficiencia en la reparación de ADN
(dMMR)

- **Monoterapia**

No requiere biomarcador PD-L1

Requiere **test MSI-H /dMMR**

Posología

200 mg —————> cada 3 semanas

400 mg —————> cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses