

Está indicado en:

CÁNCER CERVICAL (CUELLO UTERINO)

Persistente, recurrente o metastásico

- **Combinado**
(con quimioterapia ± bevacizumab*)
Requiere biomarcador para
PD-L1 (CPS \geq 1)

*Administrar PembroX® antes de la quimioterapia con o sin bevacizumab cuando se administra el mismo día.

CÁNCER CERVICAL (CUELLO UTERINO)

Recurrente o metastásico

- **Monoterapia**
Requiere biomarcador para
PD-L1 (CPS \geq 1)

Posología

200 mg \longrightarrow cada 3 semanas

400 mg \longrightarrow cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30min) hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses

Está indicado en:

CARCINOMA ENDOMETRIAL AVANZADO

- dMMR o MSI-H(+)
- Progresado luego de terapia sistémica previa (cualquier configuración) y
- No candidatos a cirugía curativa o radioterapia

● **Monoterapia**

No requiere biomarcador para PD-L1, requiere test MMR y MSI-H

CARCINOMA ENDOMETRIAL AVANZADO

- pMMR o no MSI-H (-)
- Progresado luego de terapia sistémica previa y
- No candidatos a cirugía curativa o radioterapia

● **Combinado**

(con lenvatinib)

No requiere biomarcador para PD-L1, requiere test MMR y MSI-H

Posología

200 mg → cada 3 semanas

400 mg → cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses

Está indicado en:

CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO (TNBC)

Estadio temprano, de alto riesgo

- **Neoadyuvancia, combinado**
(con quimioterapia*)

Posología

200 mg → cada 3 semanas

400 mg → cada 6 semanas

Durante 24 semanas o progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable.

Continuando tras cirugía

- **Adyuvancia, monoterapia**

Hasta recurrencia de la enfermedad, toxicidad inaceptable o hasta por 27 semanas

CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO (TNBC)

Recurrente, irresecable o metastásico

- **Combinado**
(con quimioterapia*)
Requiere **PD-L1 (CPS ≥10)**

Posología

200 mg → cada 3 semanas

400 mg → cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses

*Administrar Pembrox® antes de la quimioterapia cuando se administra el mismo día.