

Está indicado en:

## **MELANOMA**

Estadio IIB, IIC o III después de la resección completa

- **Adyuvancia, monoterapia**

No requiere biomarcador

### **Posología adultos**

---

200 mg → cada 3 semanas

400 mg → cada 6 semanas

### **Posología niños ≥12 años**

---

2mg/kg → cada 3 semanas  
(máximo 200mg)

(en infusión IV durante 30 min) hasta recurrencia de la enfermedad, toxicidad inaceptable o hasta por 12 meses

## **MELANOMA**

Irreseccable o metastásico

- **1° Línea, monoterapia.**

No requiere biomarcador

### **Posología**

---

200 mg → cada 3 semanas

400 mg → cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable

Está indicado en:

## **CARCINOMA CUTÁNEO DE CÉLULAS ESCAMOSAS**

Recurrente o metastásico, localmente avanzado no curable por cirugía o radiación

- **Monoterapia**

No requiere biomarcador

### **Posología**

---

200 mg → cada 3 semanas

---

400 mg → cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable, o hasta por 24 meses

Está indicado en:

## **CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL**

Recurrente localmente avanzado o metastásico

- **Monoterapia**

No requiere biomarcador

### **Posología adultos**

---

200 mg → cada 3 semanas

400 mg → cada 6 semanas

### **Posología niños**

---

2mg/kg → cada 3 semanas  
(máx 200 mg)

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable, o hasta por 24 meses

Está indicado en:

## **CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO**

Recurrente, metastásico o no resecable

- **1º Línea, monoterapia**  
Requiere biomarcador **PD-L1 (CPS  $\geq$ 1)**
- **1º Línea, combinado**  
(con platino y fluorouracilo\*)  
No requiere biomarcador  
\*administrar PembroX® antes de quimioterapia cuando se administren el mismo día
- **2º Línea, monoterapia**  
(en pacientes progresados a quimioterapia basada en platino)  
No requiere biomarcador

### **Posología**

200 mg → cada 3 semanas

400 mg → cada 6 semanas

(en infusión IV durante 30 min) hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o hasta por 24 meses